1/2026

BIOVETA NEWS



MIZIVERM
O ABORDARE MODERNĂ
A DEPARAZITĂRII LA CÂINI
PAGINĂ: 2.

CANIVERM PASTA ORACU
AROMĂ DE PUI ȘI DROJDIE
PENTRU CÂINI ȘI PISICI
PAGINĂ: 6.

MIZIVERM

MILBEMYCIN OXIME + PRAZIQUANTEL

COMPRIMATE AROMATE PENTRU CÂINI

FĂRĂ VIERMI INTESTINALI
FĂRĂ VIERMI LAȚI
FĂRĂ VIERMI PULMONARI ȘI VIERMI OCULARI
FĂRĂ DIROFILARII. DOAR LINIȘTE



PROTECȚIE EFICIENTĂ FĂRĂ COMPROMISURI

O ABORDARE MODERNĂ A DEPARAZITĂRII LA CÂINI

ROLUL MILBEMICINEI SI A PRAZIQUANTELULUI

Infecțiile parazitare reprezintă una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la câini[1]. Aproape fiecare câine va fi expus paraziților pe parcursul vieții. Riscul de infecție variază nu doar în funcție de vârsta câinelui, ci și de stilul său de viață și de mediul în care trăiește. Produsele antiparazitare moderne combină adesea mai multe substanțe active pentru a acționa împotriva unei game largi de paraziți. În acest scop, produsul Miziverm conține o combinație eficientă de milbemicină oxime și praziquantel.



Milbemycin Oxime: O Soluție Eficientă Împotriva Nematodelor

Milbemicina oxime face parte din grupa lactonelor macrociclice, utilizată de mulți ani în medicina veterinară. Acești compuși acționează asupra sistemului nervos al paraziților, provocând paralizia și moartea acestora. În practica veterinară, milbemicina este deosebit de eficientă împotriva nematodelor, inclusiv a paraziților gastrointestinali precum ascarizii (de exemplu, Toxocara) și ancilostomele (Ancylostoma spp.), precum și împotriva viermilor oculari și pulmonari. Este eficientă și împotriva stadiilor larvare ale viermilor cardiaci, fiind utilă în prevenirea dirofilariozei cardiace. Pentru medicii veterinari, acest lucru înseamnă că milbemicina nu doar controlează paraziții intestinali comuni, ci acționează și împotriva unor infecții care au fost raportate din ce în ce mai frecvent în Europa în ultimii ani.

Praziquantel: Tratament Eficient Împotriva Teniilor

Praziquantelul este a doua substanță activă din Miziverm și este eficient împotriva teniilor. De mult timp este considerat tratamentul de elecție pentru câinii și pisicile expuse riscului de infestare cu tenii. Praziquantelul acționează rapid și eficient împotriva celor mai importante specii de tenii, inclusiv Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus spp. și Mesocestoides spp. Câinii se pot infecta cu acești paraziți cel mai frecvent prin ingestia de purici infectați sau de gazde intermediare, precum rozătoarele. Unele specii de tenii, în special cele din genul Echinococcus, prezintă importanță și din perspectiva sănătății publice. Prin urmare, combinația dintre milbemicină și praziquantel permite controlul eficient atât al teniilor, cât și al nematodelor, într-un singur produs, ceea ce face din Miziverm o opțiune practică pentru utilizarea de zi cu zi în medicina veterinară.

Siguranța Utilizării

BezSiguranța este esențială în deparazitarea preventivă. Milbemicina are un profil excelent de siguranță și poate fi administrată cățeilor foarte tineri atunci când este utilizată la doza recomandată. Miziverm, care conține milbemicină, poate fi administrat în general cățeilor începând cu vârsta de două săptămâni și cu o greutate de peste 0,5 kg. Siguranța utilizării a fost confirmată și pentru câinii de reproducție, precum și pentru femelele gestante și în lactație. În practica veterinară, este important de menționat că milbemicina poate fi combinată în siguranță cu anumite alte antiparazitare, conform datelor disponibile. De exemplu, poate fi utilizată împreună cu Seliverm (care conține selamectină) atunci când câinele prezintă risc atât pentru paraziți interni, cât și externi.

Indicații de utilizare

Milbemicina oxime în combinație cu praziquantel controlează cei mai importanți helminți ai câinilor[2].

Grup de paraziți	Exemple
Ascarizi	*Toxocara canis, Toxascaris leonina*
Ancilostome	*Ancylostoma caninum*
Tricuri	*Trichuris vulpis*
Viermi lați	*Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.*
Viermi oculari	*Thelazia callipaeda*
Viermi pulmonari	*Angiostrongylus vasorum, Crenosoma vulpis*
Viermi cardiaci	stadiile larvare ale *Dirofilaria immitis*

Rezistența antiparazitară și importanța moleculelor moderne

Rezistența la antihelmintice reprezintă o problemă importantă. La paraziții câinilor și pisicilor, aceasta rămâne relativ rară comparativ cu cea observată la animalele de fermă. Cu toate acestea, au fost raportate cazuri de susceptibilitate redusă, în special la anumite populații de ancilostome. Utilizarea moleculelor moderne și a combinațiilor de substanțe active reprezintă una dintre abordările prin care poate fi limitată dezvoltarea rezistenței. Miziverm combină milbemicina oxime și praziquantel pentru controlul unui spectru larg de paraziți canini.

Deparazitarea cățeilor

Cățeii sunt deosebit de vulnerabili la infecțiile parazitare, care pot apărea în timpul gestației sau pot fi transmise prin laptele matern. European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) recomandă ca prima deparazitare să fie efectuată în ziua a 14-a după naștere, urmată de tratamente administrate la fiecare două săptămâni până la două săptămâni după înțărcare. Dacă există un risc crescut continuu de infecție, cum este cazul grupurilor de joacă pentru căței, tratamentele lunare ar trebui continuate până la vârsta de șase luni. După vârsta de șase luni, câinele ar trebui să urmeze un program individualizat de control antiparazitar. Obiectivul principal este controlul ascarizilor și al altor nematode intestinale, deoarece aceștia sunt cei mai frecvenți paraziți care afectează câinii tineri.



Vierme pulmonar (Angiostrongylus vasorum) – modificări patologice în plămânii unui câine



Vierme ocular (Thelazia callipaeda) în sacul conjunctival al unui câine



Vierme rotund de câine (Toxocara canis) în intestinul subțire al unui câine

Management individualizat pentru câinii adulți

La câinii adulți, frecvența deparazitării trebuie stabilită pe baza unei evaluări individuale a riscului. Factori precum stilul de viață al animalului, mediul în care trăiește și posibila expunere la gazde intermediare sau medii contaminate trebuie luați în considerare atunci când se stabilește un program de control al paraziților.



Stil de viață al câinelui	Risc de infecție	Frecvență recomandată
Câine ținut predominant în interior	scăzut	de două ori pe an
Câine care petrece regulat timp în exterior	moderat	cel puțin de 4 ori pe an
Câine care consumă gazde intermediare (de exemplu, rozătoare sau nevertebrate)	crescut	de 6–12 ori pe ană
Câine de vânătoare sau de lucru	ridicat	lunar

Mediul comun

Riscul de infecție parazitară poate fi influențat și de mediul în care trăiește câinele. Câinii care locuiesc împreună cu pisici pot fi expuși mai frecvent la Dipylidium caninum, transmis prin purici.

Câinii care trăiesc în ferme pot intra în contact cu animale de fermă, carcase sau alte surse potențiale de infecție. Câinii de vânătoare și cei de lucru sunt frecvent expuși rozătoarelor sau altor gazde intermediare ale paraziților. Acești factori de mediu și de stil de viață trebuie luați în considerare atunci când se stabilește un program adecvat de control al paraziților

Importanța examenului coproparazitologic

Examenul coproparazitologic al fecalelor câinelui poate reprezenta un instrument util pentru detectarea infecțiilor parazitare. Totuși, un rezultat negativ nu exclude neapărat prezența infecției. Mulți paraziți au o perioadă prepatentă, definită ca intervalul dintre infecție și debutul eliminării ouălor. În această perioadă, paraziții nu pot fi detectați prin metode coproparazitologice standard. Din acest motiv, asocierea examenelor coproparazitologice regulate cu deparazitarea preventivă reprezintă o abordare practică în medicina veterinară. Această strategie poate ajuta medicii veterinari să stabilească profilul individual de risc al animalului și să ajusteze corespunzător frecvența tratamentului

Rezumat pentru practica veterinară de zi cu zi

Controlul eficient al paraziților și alegerea unui produs antiparazitar adecvat trebuie să se bazeze pe vârsta animalului, stilul său de viață și riscul de expunere la paraziți. Combinația dintre milbemicină oxime și praziquantel asigură controlul eficient al celor mai importanți nematode gastrointestinale și al teniilor la câini, extinzând totodată spectrul de activitate pentru a include viermii oculari, viermii pulmonari și stadiile larvare ale viermilor cardiaci. Din acest motiv, Miziverm poate reprezenta o opțiune practică pentru controlul de rutină al paraziților în practica veterinară curentă.

MVDr. Bc. Paukner Karel, Ph.D.
Manager de produs pentru animale de companie

Referințe:
1Barrera, J. P., et al. "Intestinal parasite prevalences in dogs and cats: a decade of retrospective data from a reference veterinary laboratory in Madrid, Spain." Parasites & Vectors 19.1 (2026): 45.
2souhrn údajů o přípravku a příbalová informace přípravků Miziverm
3Rinaldi, Laura, et al. "Helminth control in kennels: is the combination of milbemycin oxime and praziquantel a right choice?." Parasites & vectors 8.1 (2015): 30.
4Ricci, Alessia, et al. "Prevalence of Capillaria spp. and other endoparasites of hunting dogs from southern Italy." Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports 60 (2025): 101255.
GL1: Worm Control in Dogs and Cats ESCCAP Guideline 01. Seventh Edition, June 2025.
ISBN: 978-1-913757-67-0



CANIVERM PASTĂ:

UN ÎNCEPUT SIGUR CĂTRE O VIAȚĂ FĂRĂ PARAZIȚI, ACUM CU AROMĂ DE PUI

Un pisoi de trei săptămâni, un cățel de 21 de zile. Un crescător care își dorește tot ce este mai bun pentru nou-născuții săi vă adresează una dintre primele și cele mai importante întrebări: cum îi pot proteja? Tratamentul antiparazitar la animalele tinere reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive pentru prima vizită la medicul veterinar, și pe bună dreptate, deoarece ascarizii îi așteaptă practic încă de la începutul vieții. În același loc pot exista pisoi și căței cu greutăți corporale surprinzător de diferite. În această situație, dozarea precisă nu este un lux, ci o necesitate. Caniverm pastă orală a fost concepută exact pentru astfel de situații. Aplicatorul gradat permite măsurarea dozelor începând de la 0,5 ml, iar administrarea direct la baza limbii asigură ajungerea produsului exact acolo unde trebuie. Fără comprimate divizate, fără estimări aproximative.

O combinație triplă pe care vă puteți baza.
Fenbendazolul, embonatul de pirantel și praziquantelul acoperă principalele specii de paraziți într-o singură doză: Aceștia sunt eficienți împotriva Toxocara canis și Toxocara cati, ascarizii care reprezintă de departe cea mai frecventă infestare la animalele tinere și care prezintă risc zoonotic.

De asemenea, acționează împotriva altor nematode (Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum și Trichuris vulpis) și împotriva cestodelor (Echinococcus spp., Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps și Mesocestoides spp). Asocierea celor trei substanțe active nu este întâmplătoare: fiecare dintre ele acționează asupra paraziților printr-un mecanism diferit și împreună oferă un spectru de acțiune pe care niciuna dintre substanțe nu l-ar putea asigura individual. O singură doză, un singur rezultat.

Aromă de pui cu drojdie, deoarece acceptarea începe cu mirosul.

Am pregătit o formulă mai atractivă a pastei, deoarece totul începe cu mirosul. Aroma specifică, care poate părea intensă pentru crescător sau chiar pentru medicul veterinar, este extrem de atractivă pentru un carnivor. Aroma de pui cu drojdie nu este o alegere întâmplătoare; a fost selectată special pentru a crește acceptarea produsului de către animal, iar la unele animale, rezistența la administrare poate deveni doar o amintire. Există și un aspect important pe care îl puteți comunica proprietarului încă de la început: un animal care acceptă cu ușurință pasta în perioada de creștere o va accepta fără dificultate și mai târziu în viață. Pentru proprietarii care nu doresc să treacă la comprimate, nu este necesară schimbarea formei de administrare. Caniverm pastă reprezintă o soluție completă pentru toate etapele vieții.

Dozare și program de deparazitare.

Doza recomandată este de 1 ml de pastă pentru fiecare 5 kg greutate corporală, administrată într-o singură doză.

Greutate corporală	Doză
0,5 – 2 kg	0,5 ml
2,1 – 5 kg	1 ml
peste 5 kg (câini)	1 ml pentru fiecare 5 kg greutate corporală

Pentru căței și pisoi, tratamentul se administrează începând cu vârsta de trei săptămâni, o doză unică la fiecare trei săptămâni până la vârsta de 12 săptămâni, apoi la fiecare trei luni.

ESCCAP recomandă stabilirea frecvenței deparazitării în funcție de profilul individual de risc al fiecărui animal: stilul de viață, mediul în care trăiește, contactul cu copiii și comportamentul de vânătoare. La animalele tinere cu istoric matern necunoscut sau aflate în condiții cu risc epidemiologic crescut, poate fi necesară administrarea mai frecventă a tratamentului. Profilul de siguranță al Caniverm, demonstrat pentru utilizarea începând cu vârsta de trei săptămâni, precum și administrarea simplă sub formă de pastă oferă medicului veterinar flexibilitatea de a adapta recomandările fiecărui pacient, exact așa cum impun bunele practici veterinare.

Caniverm pastă este un produs medical veterinar disponibil fără prescripție medicală. Aceasta înseamnă că crescătorii îl pot achiziționa nu doar din cabinetul veterinar, ci și direct din farmacia veterinară. Deparazitarea regulată reprezintă o necesitate predictibilă care revine periodic, iar crescătorii care știu exact ce caută vor reveni la dumneavoastră. Asigurați-vă că aveți întotdeauna Caniverm pastă în stoc. În caz contrar, clienții care caută produsul ar putea ajunge în altă parte.

Caniverm Pastă. Parte din trio-ul Caniverm (comprimatele forte și mite) pentru câini și pisici de toate taliile. Potrivit pentru fiecare pisoi și fiecare cățel, acum într-o formulă și mai atractivă.


Referințe: 1. Caniverm pastă orală, Rezumatul Caracteristicilor Produsului. 2. ESCCAP Guideline 01, Seventh Edition — Worm Control in Dogs and Cats European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP), June 2025. Disponibil la: www.esccap.org



Biocan® R NOVEL

VACCIN MONOVALENT INACTIVAT
IMPOTRIVA RABIEI LA CÂINI

IMUNITATE DE TREI ANI DUPĂ O SINGURĂ APLICARE DE VACCIN LA CĂȚEI MAI MARI DE 12 SĂPTĂMÂNI



BIOVETA ROMANIA SRL
Str. Avram Iancu nr. 20, ap. 2, Cluj–Napoca, e-mail: info@bioveta.ro

Dr. Remus Gabriel Plesca, PhD.
Key account manager pentru animale de companie,
Mob. 0741 165 221,
e-mail: plesca.remus@bioveta.ro

Dr. Alexandru Pop
Manager Zonal – regiunea W,
Mob. 0726 242 779,
e-mail: pop.alexandru@bioveta.ro

Dr. George Militaru
Manager zonal – regiunea S-E,
Mob. 0746 147 155,
e-mail: militaru.george@bioveta.ro

Dr. Mihai Dondea
Manager zonal- Transilvania
Mob. 0745 362 629,
e-mail: dondea.mihai@bioveta.ro

DISTRIBUITOR

BistriVet
Everything for vets and farms

S.C. BISTRI-VET S.R.L.
Str. Libertăţii nr. 13,
420 155 Bistriţa
Tel.: 0724 336 151
E-mail: comenzi@bistrivet.ro
www.bistrivet.eu

bioveta

Bioveta, a. s.
Komenského 212/12
682 23 Ivanovice na Hané
Czech Republic
www.bioveta.ro

EUROPEAN UNION